

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO
(CONFORME QUADRO DO ITEM 7 DA RDC Nº283/2005)

TAXA DE MORTALIDADE EM IDOSOS RESIDENTES	$\frac{\text{Nº DE ÓBITOS}}{\text{Nº IDOSOS RESIDENTES NO MÊS}^{(1)}} \times 100\%$	$\frac{1}{37} \times 100\% = \mathbf{3,70\%}$
TAXA DE INCIDÊNCIA DE DOENÇA DIARRÉICA AGUDA EM IDOSOS RESIDENTES	$\frac{\text{Nº DE NOVOS CASOS DE DOENÇA DIARRÉICA AGUDA}^{(2)}}{\text{Nº IDOSOS RESIDENTES NO MÊS}^{(1)}} \times 100\%$	$\frac{0}{37} \times 100\% = \mathbf{0,00\%}$
TAXA DE INCIDÊNCIA DE ESCABIOSE EM IDOSOS RESIDENTES	$\frac{\text{Nº DE NOVOS CASOS DE ESCABIOSE}}{\text{Nº IDOSOS RESIDENTES NO MÊS}^{(1)}} \times 100\%$	$\frac{0}{37} \times 100\% = \mathbf{0,00\%}$
TAXA DE INCIDÊNCIA DE DESIDRATAÇÃO EM IDOSOS RESIDENTES	$\frac{\text{Nº DE IDOSOS COM DESIDRATAÇÃO}}{\text{Nº IDOSOS RESIDENTES NO MÊS}^{(1)}} \times 100\%$	$\frac{0}{37} \times 100\% = \mathbf{0,00\%}$
TAXA DE PREVALÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO EM IDOSOS RESIDENTES	$\frac{\text{Nº DE IDOSOS COM ÚLCERA DE DECÚBITO}}{\text{Nº IDOSOS RESIDENTES NO MÊS}^{(1)}} \times 100\%$	$\frac{3}{37} \times 100\% = \mathbf{1,233\%}$
TAXA DE PREVALÊNCIA DE QUEDA COM LESÃO EM IDOSOS RESIDENTES	$\frac{\text{Nº DE IDOSOS QUE TIVERAM QUEDA COM LESÃO}}{\text{Nº IDOSOS RESIDENTES NO MÊS}^{(1)}} \times 100\%$	$\frac{1}{37} \times 100\% = \mathbf{3,70\%}$
TAXA DE PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS RESIDENTES	INDICADORES AVALIADOS E FORNECIDOS PELA EQUIPE DE NUTRIÇÃO NUTRICIONISTA SARA G. CARNEIRO SILVA	

(1) Considerar o número de idosos residentes do dia 15 de cada mês.

(2) Diarréia aguda: caracterizada pelo aumento da frequência (acima de 3vezes/dia) de eliminações de fezes semipastosas ou líquidas, sendo acompanhada por perda excessiva de líquidos e eletrólitos. (CUPPARI, 2005 & VANNUCHI e MARCHINI, 2007 & MAJID, EMERY e WHELAN, 2014)

Importante: quanto menor o valor do indicador, melhores serão as condições avaliadas.